

Adek® Forte

Lisozima
Vitaminas A, C, D₃, E

COMPOSICION

Cada 10 mL contienen:

Lisozima clorhidrato	75 mg
Vitamina A	4,400 UI
Vitamina C	100 mg
Vitamina D ₃	3,300 UI
Vitamina E	10 mg
Vehículo, c.s.	

PROPIEDADES

Este producto constituye un moderno protector y regenerador del mecanismo de defensa orgánica, ésto basado en la acción de sus distintos componentes, y que describimos brevemente a continuación:

La lisozima, enzima lisante de Fleming, de potente acción antiviral e inmunitaria inespecífica, utilizada con mucho éxito en la profilaxis y tratamiento de las afecciones víricas, favorece la recuperación del enfermo por estimulación de efectos inmunitarios.

La vitamina A, protege y regenera ciertos epitelios de las mucosas, especialmente en las vías aéreas, nariz, senos paranasales, bronquios, evitando así susceptibilidad a las infecciones frecuentes en la vitaminosis A.

La vitamina C, o ácido ascórbico, permite acortar los procesos infecciosos o virales.

La vitamina D₃, recomendada en casos de raquitismo, convalecencias, etc. La avitaminosis de esta importante vitamina conduce a los casos más arriba señalados, además brinda un excelente aporte en las alteraciones del metabolismo del calcio y fósforo por condiciones especiales.

La vitamina E protege a la vitamina A de la oxidación, es un antioxidante natural, inhibe las oxidaciones mediadas por radicales libres, favoreciendo la respiración celular.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Está indicado en caso de profilaxis y tratamiento de afecciones virales y microbianas, especialmente de las vías respiratorias.

CONTRAINDICACIONES

No emplearse en niños menores de 1 año. Hipercalcemia idiopática.

EFFECTOS INDESEABLES

Unicamente en sobredosificaciones que resultaran de una indebida administración del producto, a largo plazo podrían resultar los siguientes síntomas: náuseas, anorexia, cefaleas y poliuria. Estos desaparecen espontáneamente con la suspensión del tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No administrarse simultáneamente en pacientes con daño en hígado y/o riñón.

Las vitaminas A y D se almacenan en el hígado y se excretan por las heces. Dado que su metabolismo es muy lento, la sobredosis puede producir efectos tóxicos.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No debe administrarse, ya que durante estos períodos los requerimientos mínimos diarios deben ser restringidos y considerados por el médico.

INTERACCIONES

Deben tomarse precauciones al utilizarlo simultáneamente con los fármacos siguientes: neomicina y colestiramina oral, diuréticos del tipo tiazídicos. El aceite mineral puede disminuir la absorción de la vitamina A. Grandes dosis de vitamina A pueden incrementar el efecto hipoprotrombinémico de la warfarina.

JARABE

PROTECTOR Y REGENERADOR DE LOS EPITELIOS
BRONQUIALES Y ACTIVADOR DEL MECANISMO
DE DEFENSA DEL ORGANISMO

SOBREDOSIS

En caso de existir sobredosificación se aconseja efectuar lavado gástrico. Discontinuar el medicamento hace desaparecer prácticamente todos los síntomas.

USO Y DOSIS

Salvo prescripción médica, adultos, 10 mL al día hasta terminar el frasco. Niños, 5 mL al día hasta terminar el frasco. Esta dosis puede ser aplicada 2 veces al día siempre y cuando el médico lo considere necesario. Se tomará al principio de la comida o en ayunas, sólo o vertido en un poco de agua azucarada, jugo de frutas, chocolate, leche, etc. o cualquier otro líquido preferido por el paciente (1/4 de vaso).

Para suministrar el jarabe utilizar la copa dosificadora graduada, colocada sobre la tapa del envase.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.

PRESENTACION

Caja conteniendo un frasco de 100 mL y copa dosificadora.

Registro Industrial No. 14109

Registro Sanitario No. PRS-ME-2017-0272

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.