

# Dermofurin®

## Nitrofurazona

POMADA

ANTIBACTERIANO Y FAVORECEDOR DE LA CICATRIZACION

### COMPOSICION

#### 30 g de pomada contienen:

Nitrofurazona 60 mg

Excipientes, c.s.

### PROPIEDADES

Es un derivado del furano, anillo heterocíclico, que al adicionarle un grupo nitro en la posición 5 del anillo furánico y obtenida por síntesis, esto le confiere excelente propiedad antibacteriana, pudiéndose catalogar este nitrofurano el más conveniente como antiséptico local.

Es un quimioterápico, no un antibiótico y su efecto antibacteriano es de amplio espectro, ejerciéndolo ampliamente sobre una gran variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas y ciertos protozoarios, pero desarrolla resistencia a la Pseudomona aeruginosa comúnmente presente en infecciones cutáneas, aún en aquellas resistentes a algunos antibióticos.

Por los excipientes incorporados en la formulación, se logra un favorable efecto exudativo y depurador que condiciona las propiedades naturales de la piel, proporcionando a la misma un grado de humedad idóneo para acelerar el perfecto desarrollo de los tejidos en reparación.

Prácticamente no se absorbe por la piel intacta o quemada ni por las mucosas.

### INFORMACION CLINICA

#### INDICACIONES

Es muy eficaz en la prevención o tratamiento, así como para favorecer la cicatrización, de infecciones bacterianas superficiales tales como:

Heridas, traumatismos, quemaduras, intervenciones quirúrgicas, úlceras cutáneas, piodermias, osteomielitis, implantación de injertos cutáneos, colostomías, lesiones anorectales, circuncisión y episiografía.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al producto.

#### EFFECTOS INDESEABLES

Al ser soluble su aplicación no se produce dolor. El riesgo de sensibilización y neumonitis alérgica por uso indiscriminado o alergia al compuesto cede con solo discontinuar el tratamiento.

#### PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos.

#### INTERACCIONES

Se desconocen interacciones con otros productos de aplicación tópica, sin embargo puede administrarse sin problemas con otros medicamentos de acción sistémica.

#### SOBREDOSIS

No existe información disponible en relación al tratamiento de la sobredosificación. Ante cualquier eventualidad, consultar con su médico.

#### MODO DE EMPLEO

Aplicar suficiente cantidad de pomada directamente en la herida o preferiblemente en gasa impregnada con la pomada. Esto deberá realizarse 1-3 veces al día.

#### VIA DE APLICACION

Tópica.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

### INFORMACION FARMACEUTICA

#### DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.

#### CONTENIDO Y PRESENTACION

Caja conteniendo un tubo de 30 g.

Registro Industrial No. 14109

Registro Sanitario No. 11798

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.  
de República Dominicana.