

Loción EPC®

Minoxidil

COMPOSICION

100 mL contienen:

Minoxidil 2% y 5%, respectivamente
Vehículo, c.s.

PROPIEDADES

La aplicación tópica de la loción EPC actúa penetrando en el cuero cabelludo, fortaleciendo los folículos pilosos, estimulando el nacimiento de cabello nuevo y evitando la pérdida excesiva o afinamiento del mismo. Los mejores resultados se observan cuando se inicia el tratamiento a edades tempranas o apenas se empieza a notar pérdida o afinamiento del cabello. Estos resultados empiezan a manifestarse a partir de los primeros 2-4 meses luego de iniciar el tratamiento.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Tratamiento de la calvicie, pérdida, debilidad o afinamiento del cabello.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicada en aquellos pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a esta sustancia, etanol o propilenglicol.

EFFECTOS INDESEABLES

Estas fueron reacciones dermatológicas de poca importancia, como descamación, eritema, congestión facial, dermatitis, piel seca y muy raras veces hipertriosis en áreas en las que no se aplicó el producto, sensación de ardor y erupción cutánea.

Estas reacciones adversas comunicadas en forma infrecuente, incluyen reacciones alérgicas tales como sensibilidad, urticaria, eritema generalizado e hinchazón facial, mareos, sensación de hormigueo, cefalea, debilidad, neuritis, edema, irritación ocular, alteración del gusto, infección ótica y trastornos visuales.

Las reacciones adversas raramente comunicadas incluyen alopecia, anomalías en el pelo, dolor de pecho, cambios en la presión sanguínea, hepatitis y cálculos renales.

PRECAUCIONES

En caso de contacto accidental con superficies susceptibles (ojos, piel excoriada, mucosas), el área deberá lavarse con abundante agua fría. La ingestión accidental puede producir efectos adversos serios, por lo cual deberá mantenerse fuera del alcance de los niños.

Usar con precaución en pacientes hipertensos y cardiopatas medicados para la misma.

USO EN EMBARAZO, LACTANCIA, PEDIATRIA Y GERIATRIA

Es preferible hasta tanto no exista seguridad absoluta, no utilizar en mujeres embarazadas o que estén amamantando. No se ha establecido la seguridad absoluta ni su eficacia, en personas menores de 18 años ni mayores de 65 años.

INTERACCIONES

Corticoides, petrolato o retinoides tópico (su uso concurrente puede elevar la absorción cutánea del minoxidil tópico, porque incrementan la permeabilidad del estrato córneo y no es recomendado). Guanetidina (su uso concurrente puede incrementar la posibilidad de la hipotensión ortostática).

SOBREDOSIS

La ingestión accidental puede producir efectos sistémicos relacionados con la acción vasodilatadora de esta sustancia. Los signos y síntomas de sobredosificación serían muy probablemente efectos cardiovasculares asociados con retención de líquidos, presión sanguínea disminuida y taquicardia. La retención de líquidos puede controlarse con una terapia diurética apropiada. La taquicardia con la administración intravenosa de solución salina isotónica. Debido a su excesiva actividad estimulante cardíaca, se deberán evitar los fármacos simpaticomiméticos tales como norepinefrina y epinefrina.

ADVERTENCIAS

Sólo para uso externo.

Aunque los siguientes efectos no estuvieron relacionados con la aplicación

LOCION CAPILAR AL 2% Y AL 5%

ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO

tópica de este producto, la piel absorbe algo de la sustancia, y podría existir la eventualidad de efectos sistémicos, tales como taquicardia, angina, edema o potenciación de la hipotensión ortostática producida por la guanetidina. Al inicio por vez primera, los pacientes deberán ser observados por si aparece cualquier indicación de efectos sistémicos. Si esto ocurriera se suspenderá el uso del producto. Si fuera necesario, la retención de líquidos y el edema pueden controlarse con un diurético. La angina y la taquicardia pueden controlarse con la administración de fármacos beta-adrenérgicos u otros supresores del sistema nervioso simpático. En caso de presentarse efectos sistémicos o reacciones dermatológicas severas, los pacientes deberán suspender el uso del producto y ponerse en contacto con su médico. Esta solución puede variar en color de rosa pálido amarillo. Esta variación no altera en absoluto la eficacia del producto.

MODO DE APLICACION

Aplicar en la mañana y en la noche con masajes delicados, suficiente loción sobre el cuero cabelludo.

VIA DE APLICACION

Tópica.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

PRESENTACION

Caja conteniendo un frasco de 100 mL de loción capilar al 2%.

Caja conteniendo un frasco de 100 mL de loción capilar al 5%.

NOTA IMPORTANTE

Obtenido los resultados esperados, el producto deberá ser utilizado indefinidamente, pues si se suspende se produciría una regresión al estado previo del tratamiento.

NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO

Loción capilar al 2%: 2008-1053

Loción capilar al 5%: 88-2472

Registro Industrial No. 14109

Venta libre sin receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

Doc. No.: YDP2006

Rev.: H

Aprob. por: Gte. Desarrollo de Productos / Gte. Mercadeo

Ethical

Pi000327