

Colibinef[®]

Propantelina
Fenazopiridina

COMPRIMIDOS

ANTIESPASMODICO Y ANALGESICO DE LAS
VIAS URINARIAS

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Propantelina bromuro 15 mg
Fenazopiridina 50 mg
Excipientes c.s.

PROPIEDADES

Bromuro de propantelina: Sustancia anticolinérgica de potente acción a nivel del uréter, es considerada el más efectivo antiespasmódico en el cólico renal y el más utilizado con éxito en la expulsión de cálculos y arenillas.

Fenazopiridina: Esta proporciona una suave analgesia en la mucosa del tracto genitourinario, siempre irritada y traumatizada en estos casos.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Ha sido desarrollado para el tratamiento de la litiasis renal, es decir, cuando exista la presencia de cálculos o arenillas en el tracto genitourinario de cualquier sexo, éstas con dimensiones factibles de expulsar, previamente establecidas radiológicamente y por convicción y criterio del médico especialista.

Gracias a su acción anticolinérgica, analgésica moderada, antiséptica y sedante, mitiga en todas sus vertientes los fenómenos desagradables de esta afección, como son, dolor, molestias, inflamación, irritación, etc., hasta lograr la expulsión de los mismos.

También puede ser utilizado en todos los casos que se requiera una acción espasmolítica, sedante y antiséptica del tracto genitourinario.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal y enfermedades obstructivas del tracto gastrointestinal y urinario. Coma hepático. Estados de carencia de electrólitos. Embarazo. Glaucoma.

EFFECTOS INDESEABLES

Debido al bromuro de propantelina, pueden presentarse diversos grados de sequedad de las secreciones salivares, así como midriasis y visión borrosa. Además se han reportado casos aislados de nerviosismo, somnolencia, mareos, insomnio, cefaleas, taquicardia, pérdida del sentido del gusto, náuseas, vómitos, constipación, dermatitis alérgicas y anafiláctica.

Por la fenazopiridina, ocasionalmente podrían presentarse trastornos gastrointestinales o erupciones cutáneas en pacientes susceptibles a esta sustancia. Debido a éste componente, durante el uso del producto, la orina tenderá a teñirse de color rojo-anaranjado, lo que no debe ser motivo de preocupación

La dosis excesiva puede ocasionar metahemoglobinemia.

INTERACCIONES

En el caso de la fenazopiridina evitar administración conjunta con: metenammina, hipoglucemiantes orales, fenitoína, metotrexato.

La propantelina reduce la motilidad gastrointestinal y el vaciado estomacal, manifestándose esta acción en un aumento de la magnitud de la absorción de numerosos fármacos como la clorotiazida, digoxina, hidroclorotiazida, litio y paracetamol.

PRECAUCIONES

El uso de éste medicamento debe ser realizado por prescripción y vigilancia exclusiva del médico.

SOBREDOSIS

La sobredosis puede provocar metahemoglobinemia, anemia hemolítica y toxicidad hepática y/o renal. En caso de sobredosificación deberán proporcionarse las medidas adecuadas de apoyo, tales como: lavado gástrico, monitoreo estrecho de las condiciones del paciente y proporcionar apoyo cardiorrespiratorio, en caso necesario.

ADVERTENCIAS

De cumplir el paciente la posología del médico e instrucciones y sin interrumpir el tratamiento por olvido o descuido, las molestias y repeticiones del cólico nefrítico son eliminadas en un alto porcentaje. Sin embargo, al no contener ningún analgésico potente en su fórmula, esto debido a los efectos colaterales que podrían aparecer por el uso continuo de los mismos, será necesario inyectar un analgésico en caso de presentarse crisis aguda. Para los mejores resultados con el uso del tratamiento, es conveniente beber por lo menos un vaso de agua cada 3 horas y así incrementar el volumen de la orina y consecuentemente ayudar el desplazamiento del cálculo o arenilla.

USO Y DOSIS

Salvo prescripción médica:

Adultos: Un comprimido cada 4 horas.

Niños: Medio comprimido cada 4 horas.

Se aconseja no aumentar las dosis señalada y aconsejada por el médico.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.

PRESENTACION

Caja conteniendo 2 tirillas de 10 comprimidos.

NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

Registro Industrial No. 14109

Registro Sanitario No. 98-0447

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.**