

# Pazz®

Hidroxizina

## COMPOSICION

Cada tableta contiene:  
Hidroxizina clorhidrato 25 mg  
Excipientes, c.s.

## PROPIEDADES

Es un agente ansiolítico y psicléptico que no produce adicción, tampoco se relaciona químicamente con las fenotiazinas, la reserpina, el meprobamato o las benzodiazepinas.

No es un depresor cortical, su acción puede deberse a la supresión de actividad en ciertas zonas clave del área subcortical del sistema nervioso central (SNC).

Acciones antialérgicas y antieméticas se han demostrado experimental y clínicamente.

Ha mostrado su eficacia para aliviar el prurito en varias formas de urticaria, eccema y dermatitis.

## FARMACOCINETICA

La administración por vía oral se absorbe rápidamente y sus efectos sistémicos se observan antes de 30 minutos. Su acción dura de 4-6 horas. Se metaboliza en hígado 70% a 90% y una fracción pequeña se excreta por orina, sin modificar.

## TOXICOLOGIA

Estudios teratogénicos en animales mostraron anomalías fetales en ratas y ratones en dosis superiores al rango terapéutico humano. Como medida de precaución, no se recomienda durante el embarazo.

## INFORMACION CLINICA

### INDICACIONES

Ansiedad, angustia, estrés, nerviosismo, intranquilidad, irritabilidad. Trastornos gástricos y de la piel de origen emocional, trastornos alérgicos.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los constituyentes de la fórmula, y otros derivados.

Embarazo, lactancia, niños menores de 6 años y pacientes que estén utilizando simultáneamente medicamentos depresores del sistema nervioso central.

### EFFECTOS INDESEABLES

Sedación, somnolencia (puede desaparecer después de varios días de terapia continuada) y sequedad de boca. Más raramente pueden aparecer crisis convulsivas, temblor y agitación.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las personas de edad avanzada pueden ser más sensibles a los efectos de esta sustancia. El uso prolongado puede disminuir o inhibir el flujo salival. Se debe advertir a los pacientes que no tomen alcohol, ya que puede potenciar los efectos sedantes, y de que hay que tener precaución si se produce somnolencia.

### USO EN EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No debe ser utilizado.

### INTERACCIONES

El uso simultáneo con alcohol u otras drogas depresoras del sistema nervioso central puede potenciar los efectos depresivos de estas drogas.

### SOBREDOSIS

Los síntomas observados después de una sobredosis importante de hidroxizina se asocian principalmente con una carga anticolinérgica excesiva, depresión del SNC o estimulación paradójica del SNC. Esto incluye náusea, vómito, taquicardia, pirexia, somnolencia, disfunción del reflejo pupilar, temblor, confusión o alucinaciones. Esto puede ser seguido por una depresión en el nivel de conciencia, depresión respiratoria, convulsiones, hipotensión o arritmia cardíaca. También pueden presentarse coma profundo y colapso cardiorrespiratorio. Debe realizarse el lavado gástrico antes de una intubación endotraqueal, si ha ocurrido una ingestión clínicamente significativa. Puede administrarse carbón activado, aunque no

## TABLETAS

### ANSIOLITICO - TRANQUILIZANTE

se cuenta con los datos suficientes que apoyen su eficacia. El uso de hemodiálisis o hemoperfusión es dudosamente útil. No existe ningún antídoto específico.

### USO Y DOSIS

Salvo criterio contrario del médico, la dosis usual para adultos es 1 tableta cada 12 ó 24 horas.

### VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

**Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.**

**En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.**

### INFORMACION FARMACEUTICA

#### DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.

### PRESENTACION

Caja conteniendo 25 sobres de 4 tabletas para detallar.

### NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

Registro Industrial No. 14109

Registro Sanitario No. 2007-1468

Consulte a su médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.  
de República Dominicana.