

Doloespam[®]

Propinoxato

SOLUCION GOTAS ORALES PEDIATRICAS

ANTIESPASMODICO

COMPOSICION

Cada mL contiene:

Propinoxato 10 mg
Vehículo, c.s.

PROPIEDADES

Es un fármaco espasmolítico cuya acción principal de efecto específico y potente musculotrópico (relajación directa inespecífica) la realiza sobre el músculo liso, reduciendo su tono y motilidad y, secundariamente, por su acción neurotrópica leve, lo que reduce ostensiblemente la incidencia de efectos adversos.

FARMACOCINETICA

Luego de su administración oral, la concentración plasmática máxima se alcanza dentro de la primera hora. El metabolismo y la eliminación se cumplen en el hígado. La vida media de eliminación es de 4 horas. La unión a las proteínas plasmáticas es de un 90%.

TOXICOLOGIA

Las experiencias realizadas para la toxicidad especial no han evidenciado potencial teratogénico, carcinogénico ni mutagénico.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Píloroespasmos del lactante. Espasmos y trastornos del tracto gastrointestinal y genitourinario en general.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo. Glaucoma, hipertrofia prostática, estenosis orgánica del píloro.

EFFECTOS INDESEABLES

Es bien tolerado y en las dosis indicadas carece de efectos secundarios. Es virtualmente atóxico y no reconoce antagonismos farmacodinámicos. Puede asociarse al tratamiento básico de las afecciones en curso, como también a los analgésicos comunes. En pacientes particularmente sensibles, al administrar dosis altas, puede aparecer sequedad de boca o constipación, modificables mediante un ajuste posológico.

PRECAUCIONES

Su administración no requiere precauciones especiales, salvo en pacientes con glaucoma, retención urinaria por enfermedades prostáticas y estenosis pilórica orgánica, casos en que es conveniente evitar su empleo.

USO EN EMBARAZO

Siguiendo normas internacionales no se recomienda su empleo durante los tres primeros meses de embarazo.

INTERACCIONES

El tratamiento simultáneo con fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos y antiarrítmicos, pueden potencializar el efecto antimuscarínico.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosificación o ingesta accidental, de acuerdo con la variación individual en la respuesta a los fármacos, puede ocasionar sequedad de boca y garganta, visión borrosa, taquicardia y palpitaciones, somnolencia. Se recomienda vaciamiento o lavado gástrico y/o suspender la administración del medicamento.

USO Y DOSIS

Salvo criterio contrario del médico y de cada caso en particular, la dosis normal es la siguiente:

Lactantes y niños menores de 1 año: 1 gota 3-5 veces al día.
Niños mayores de 1 año: 2 gotas por cada año de edad, 3-5 veces al día.
Las gotas pueden agregarse a cualquier bebida, agua, jugo o leche.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

PRESENTACION

Caja conteniendo un frasco de 20 mL.

Registro Industrial No. 14109

Registro Sanitario No. 2011-0553

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.