

Liozima

Ethical

CAPSULAS

ANTIINFLAMATORIO DEL ARBOL RESPIRATORIO

COMPOSICION

Cada cápsula contiene:

Liozima 250 mg
Excipientes, c.s.

PROPIEDADES

La liozima es una enzima presente en las lágrimas y la saliva en donde actúa como una barrera frente a las infecciones. También es muy abundante en la clara del huevo, de donde se extrae para su uso industrial, en particular para el control de las bacterias lácticas en los vinos. Fue descubierta por Fleming, el mismo que descubrió la penicilina. Además de encontrarse en la saliva y en las lágrimas, está presente en el bazo, los pulmones, los leucocitos, el plasma, la leche y el cartílago. La deficiencia en liozima, debida a mutaciones en el gen LYZ situado en el cromosoma 12, ha sido asociada a displasias esqueléticas y a un aumento de la propensión a las infecciones.

Su acción catalítica consiste en la rotura del enlace glicosídico 1-4 característico de los peptidoglicanos bacterianos, cuyo disacárido constitutivo es N-acetil glucosamina-N-acetil murámico. Es activa sobre todo frente a las bacterias gram-positivas, siendo menor su actividad frente a las bacterias gram-negativas.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Profilaxis y tratamiento de infecciones bucofaríngeas (estomatitis, gingivitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, etc), para estimular las reacciones del organismo y como coadyuvante de la acción de antibióticos o quimioterápicos.

Como antiviral en herpes zoster simple, hepatitis vírica, parotiditis, varicela, sarampión, gripe, queratitis herpética.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al medicamento.

EFFECTOS INDESEABLES

Las reacciones alérgicas más frecuentes son las hipersensibilización: se han descrito urticaria, angioedema y dermatitis atópica.

PRECAUCIONES

No se debe administrar en combinación con penicilinas, cloranfenicol y nitrofurantoína.

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Las enzimas se toleran muy bien. Pueden ser usadas durante el embarazo si se respeta la dosis recomendada.

INTERACCIONES

Potencia la acción de las penicilinas, cloranfenicol y nitrofurantoína contra los estafilococos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes dosis, pueden producirse molestias digestivas. Acudir al centro médico más cercano.

USO Y DOSIS

Salvo criterio contrario del médico, una cápsula 2-4 veces al día.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

PRESENTACION

Caja conteniendo 5 tirillas de 6 cápsulas.

NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

Registro Industrial No. 14109

Registro Sanitario No. 2014-1282

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.