

Nimopin®

Nimodipina

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Nimodipina 30 mg y 60 mg, respectivamente
Excipientes, c.s.

PROPIEDADES

Actúa en las neuronas y selectivamente en los capilares cerebrales. Se une en forma reversible con un alto grado de especificidad a receptores que están vinculados a canales de calcio.

Estos receptores se encuentran principalmente en neuronas del hipocampo y la corteza cerebral, áreas que están asociadas a los procesos de aprendizaje y memoria. Al interactuar con estos receptores, modula el flujo de iones de calcio hacia la célula nerviosa. Así tiene un efecto sobre la actividad eléctrica de las neuronas y es capaz de influenciar el balance de neurotransmisores.

También actúa en receptores de canales de calcio de los vasos sanguíneos cerebrales, con lo que se reduce el influjo de iones de calcio hacia las células de la musculatura lisa vascular, regulando así el tono de los vasos sanguíneos.

Debido a esta acción sobre receptores neuronales y cerebrovasculares, asociados a canales de calcio, protege y estabiliza la función neuronal y mejora el flujo sanguíneo cerebral e incrementa la tolerancia a la isquemia.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Tratamiento de las deficiencias orgánicas cerebrales con síntomas tales como pérdida de memoria, disminución de la motivación y concentración, labilidad emocional.

Profilaxis y tratamiento del déficit neurológico isquémico debido a vasoespasmos cerebrales tras hemorragias subaracnoideas de origen aneurismático y traumático.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con edema cerebral generalizado, presión intracraneal severamente elevada, insuficiencia cardiovascular severa, hipotensión grave e insuficiencia hepática.

EFFECTOS INDESEABLES

Pueden desencadenarse las siguientes manifestaciones: cefaleas, mareos, molestias gastrointestinales, astenia, rubefacción facial (flush), sensación de calor, hipotensión (especialmente cuando los valores tensionales iniciales están elevados), edema periférico, hiperactividad del SNC, hiperquinesia y en casos aislados estados depresivos.

PRECAUCIONES

Tratamiento del déficit neurológico de origen isquémico: En pacientes adultos mayores, con patologías múltiples (comorbilidades), o en presencia de insuficiencia renal severa (filtración glomerular 20 mL/min.) y en aquéllos con insuficiencia cardíaca severa, el tratamiento debe ser evaluado cuidadosamente y estos pacientes deben ser vigilados con monitoreo constante.

Profilaxis y tratamiento de los déficit neurológicos isquémicos consecutivos al espasmo arterial cerebral por hemorragia subaracnoidea de etiología aneurismática: Aunque este tratamiento no ha mostrado estar asociado con un incremento de la presión intracraneal, se recomienda en estos casos realizar monitoreo continuo, de la misma forma cuando aumenta la concentración del líquido en el tejido cerebral (edema cerebral generalizado).

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Usar solo bajo estrictas indicaciones.

INTERACCIONES

Antihipertensivos, por potenciación al efecto: cimetidina por posible aumento del nivel sérico de esta sustancia; debe ser evitado un tratamiento endovenoso concomitante con bloqueadores beta; posibles interacciones con medicamentos activadores del SNC y glucósidos cardíacos.

Fármacos antiepilépticos como fenobarbital, fenitoína y carbamazepina.

COMPRIMIDOS

VASOTERAPIA CEREBRAL

SOBREDOSIS

En caso de sobredosificación deberá establecerse el tratamiento sintomático oportuno.

USO Y DOSIS

Salvo prescripción facultativa diferente, se recomienda las siguientes pautas de dosificación:

Para el tratamiento de las deficiencias orgánicas cerebrales: 1 comprimido de 30 mg 3 veces al día (cada 8 horas).

Para la profilaxis y tratamiento del déficit neurológico isquémico: 1 comprimido de 60 mg 6 veces al día (cada 4 horas) durante el tiempo que el médico considere necesario.

El intervalo de esta dosificación no debe ser nunca menor de 4 horas.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.

PRESENTACION

Caja conteniendo 3 tirillas de 10 comprimidos.

NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO

Comprimidos de 30 mg: 97-0340

Comprimidos de 60 mg: 2001-2219

Registro Industrial No. 14109

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.